



Les tests de lecture de Médecine



Ce test de lecture porte sur le contenu du numéro 1 de janvier 2018.
Il ne comporte aucune question piège, sauf ambiguïté bien involontaire de notre part.

Parmi les questions ci-dessous cocher la ou les affirmation(s) exacte(s) s'il y en a !

- 1** A. Les probiotiques ont la capacité d'inhiber le développement de certaines bactéries à Gram négatif en abaissant le pH intestinal.
B. Les probiotiques sont recommandés dans la prise en charge des troubles liés au syndrome de l'intestin irritable.
C. L'utilisation des probiotiques est actuellement déconseillée chez des patients immunodéprimés.
D. L'utilisation des probiotiques est actuellement déconseillée chez des patients porteurs de cathéter central.
E. Les études cliniques ont démontré l'efficacité des probiotiques pour la prévention des candidoses vulvovaginales.
- 2** A. Un enfant et un adolescent sur deux de 0 à 15 ans présentent un déficit en sommeil.
B. Selon une étude de l'Insee, au cours des dernières décennies, la durée nocturne du sommeil des enfants entre 3 et 10 ans diminue régulièrement de 10 min/an.
C. Des causes comportementales sont trois fois sur quatre responsables d'une carence en sommeil.
D. Un enfant de 6 ans a besoin de 11 heures de sommeil.
E. Le déficit de sommeil diminue les défenses immunitaires.
F. Un engagement excessif des parents pour rassurer l'enfant au moment de l'endormir est associé à une augmentation des problèmes de sommeil rapportés.
- 3** A. Une consultation de médecine générale en France comporte en moyenne entre deux et trois motifs de consultation.
B. Le nombre de contacts médicaux pour un patient (médecin généraliste, spécialistes) est d'environ une fois par mois.
C. Des consultations plus fréquentes ont pour conséquence une diminution du nombre de motifs pour chaque consultation.
D. En début de consultation, le médecin interrompt son patient en moyenne au bout de 30 secondes.
E. Une proximité relationnelle importante entre le patient et le médecin favorise d'emblée l'émergence des motifs de consultation.
F. Une écoute et des phrases ouvertes telles que « quoi d'autre ? » en début de consultation permettent de limiter l'émergence de demandes supplémentaires en fin de consultation.
- 4** A. Une alcoolisation aiguë peut avoir pour conséquence une pancytopenie qui peut mettre plusieurs jours à se réparer.
B. Un quart des consultations de médecine générale comporte un risque d'infection liée aux soins.



Réponses exactes au test de lecture de janvier 2018 portant sur le n° 10 de décembre 2017, volume 13 :

Réponses exactes :
1. A, C, D, E, F
2. A, B, C, D, F
3. A, C, D
4. A, B
5. A, C, D, E, F