

Le relevé des relevés

Polio virus sauvage type 2 : interruption apparente de la transmission au niveau mondial

Actuellement, les régions OMS des Amériques et du Pacifique occidental ont été certifiées exemptes de poliomyélite. La transmission du polio virus sauvage type 2 est interrompue dans le monde entier. La transmission du polio virus sauvage type 1 et 3 continue de régresser dans les régions OMS encore touchées (2000 : 2 824 cas). L'éradication des types 1 et 3 est à l'horizon 2005.

Fièvre jaune en Côte d'Ivoire

À la suite de 4 cas (3 décès) signalés au sud-ouest du pays, une campagne de vaccination a été entreprise.

REH 2001 ; n° 23

Trichinose humaine en Italie

En janvier 2001, 7 immigrants ont présenté une trichinose humaine après consommation de saucisses de porc fumé en provenance d'Europe orientale.

REH 2001 ; n° 13

Fièvre jaune au Brésil

À 13 mars 2001, 48 cas présumés, 20 cas confirmés (IGM Elisa) dans l'état du Minas Gerais (9 décès).

REH 2001 ; n° 13



Peste en Zambie

À 15 mars 2001, 23 cas dont 3 décès dans la province orientale ont été enregistrés. Des mesures appropriées de santé publique ont été prises.

REH 2001 ; n° 13

Méningococcémie dans la ceinture africaine de la méningite

	Cas (n)	Décès (n)
Bénin	7 532	300
Burkina Faso	10 897	1 525
Ethiopie	4 138	242
Niger	4 014	321
Tchad	5 780	607

Fin avril 2001, les principaux pays touchés par l'épidémie de méningococcémie ont déclaré :

Fièvre Ebola en Ouganda

À 28 février 2001, fin de la flambée due au virus Ebola : 224 décès au total ont été notifiés.

REH 2001 ; n° 10